



GEGEN FÄULE CONTRE POURRITURE

5 g

Switch® HG

Fungizid

Fungizid-Granulat gegen Buchs-
triebsterben, Graufäule (Botrytis)
und Schneeschimmel in den Frei-
land-Kulturen Bäume und Sträucher
ausserhalb Forst und Rasen.

Anwendung Zierpflanzen

**Bäume und Sträucher ausserhalb Forst im Frei-
land:** 0,1–0,12 % (1 g/l bis 0,83 l Wasser) gegen
Graufäule (Botrytis cinerea). Maximal 2 Behand-
lungen pro Parzelle und Jahr.

Buchsbäume (Buxus): 0,1 % (1 g/l Wasser)
gegen Cylindrocladium-Trieb- und Blattsterben.
Anwendung: Ab Mitte April bis Oktober. Maximal
1 Behandlung pro Parzelle und Jahr.

Zier- und Sportrasen: 1 g/6,7 m² (in 0,67 l Was-
ser) gegen Schneeschimmel. Maximal 1 Behand-
lung pro Parzelle und Jahr.

Beachten

Bewilligt für die nichtberufliche Verwendung.
Maximal 1 Behandlung pro Parzelle und Jahr. Bei
der Anwendung des Mittels Schutzhandschuhe
tragen. Bäume und Sträucher ausserhalb Forst und
Buchsbäume jeweils im Freiland: Zum Schutz von
Gewässerorganismen muss sichergestellt werden,
dass bei der Anwendung kein Sprühnebel in Ober-
flächengewässer gelangt. Die Wiederverwendung
der Gebinde ist verboten.

Jugendschutz: Die berufliche Verwendung dieses
Produkts durch Jugendliche ist eingeschränkt
oder ganz verboten. Weitere Informationen sind im
Technischen Merkblatt und im Sicherheitsdaten-
blatt (Abschnitt 15).

Erste Hilfe

Beschmutzte Kleidung vor Wiedergebrauch waschen.
Nach Hautkontakt sofort mit Wasser und Seife
abwaschen. Nach Augenkontakt (Kontaktlinsen
entfernen) sofort mit viel Wasser mehrere Minuten
lang ausspülen, auch unter den Augenlidern. Bei
anhaltenden Beschwerden Arzt aufsuchen. Nach
Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen.
Verpackung oder Etikett bereithalten wenn Sie das
Toxikologische Informationszentrum oder einen
Arzt anrufen, oder wenn Sie einen Arzt zu einer
Behandlung aufsuchen.

Lagerung

Kühl, aber frostfrei, trocken und in verschlossenen
Originalgebinden aufbewahren. Von Nahrungsmit-
teln, Getränken und Futtermitteln fernhalten und für
Haustiere unerreichbar aufbewahren.

Fongicide granulé contre le cylindro-
cladium, la pourriture grise (botrytis)
et la moisissure des neiges pour les
cultures de plein champ des arbres
et arbustes hors forêt et le gazon.

Emploi

Plantes ornementales

Arbres et arbustes hors forêt en plein champ:
0,1–0,12 % (1 g/l à 0,83 l d'eau) contre la
pourriture grise (Botrytis cinerea). 2 traitements par
parcelle et par année au maximum.

Buis (Buxus): 0,1 % (1 g/l d'eau) contre cylindro-
cladium-dépérissement des feuilles et rameaux.
Application: de mi-avril à octobre. 1 traitement par
parcelle et par année au maximum.

Gazon d'ornement et terrains de sport: 1 g/6,7 m²
(dans 0,67 l d'eau) contre moisissure de neiges.
1 traitement par parcelle et par année au maximum.

À observer

Autorisé pour l'utilisation non professionnelle.
1 traitement par parcelle et par année au maximum.
Lors de l'application du produit, porter des gants
de protection. Arbres et arbustes hors forêt et buis
(buxus) ceux-ci en plein champ: Pour protéger les
organismes aquatiques, il y a lieu de s'assurer que le
nuage de pulvérisation ne parvient pas dans les eaux
de surface lors de l'application. La réutilisation de
l'emballage est interdite.

Protection de la jeunesse: L'utilisation profes-
sionnelle de ce produit par des jeunes est restreinte ou
interdite. Plus d'informations sont disponible dans
la fiche technique ou dans la feuille de sécurité
(chapitre 15).

Premiers soins

Laver les vêtements contaminés avant de les
remettre. En cas de contact cutané, laver immédia-
tement et abondamment à l'eau et au savon. En cas
de projection dans les yeux (enlever les lentilles de
contact) rincer immédiatement et abondamment à
l'eau pendant au moins 15 minutes, y compris sous
les paupières. En cas de persistance des symp-
tômes, consulter un médecin. En cas d'ingestion,
consulter immédiatement un médecin. Se munir de
l'emballage ou de l'étiquette lorsque vous appelez
le numéro d'urgence, un centre antipoison ou un
médecin.

Stockage

Conservé dans un endroit frais, mais à l'abri du
gel et sec dans les emballages d'origine fermés.
Conservé à l'écart des aliments, boissons et
animaux domestiques.

Fungicida granulare contro il Cylindro-
cladium del bosso, marciume
grigio (botrite) e muffa delle nevi
per le colture in pieno campo di al-
beri e arbusti al di fuori della foresta
e tappeto erboso.

Impiego

Piante ornamentali

**Alberi e arbusti al di fuori della foresta in pieno
campo:** 0,1–0,12 % (1 g/l a 0,83 l d'acqua) contro
il marciume grigio (Botrytis cinerea). Al massimo
2 trattamenti per anno e particella.

Bosso (Buxus): 0,1 % (1 g/l d'acqua) contro il
Cylindrocladium buxicola. Applicazione: Da metà
aprile fino ad ottobre. Al massimo 1 trattamento per
anno e particella.

Tappeti erbosi e terreni sportivi: 1 g/6,7 m² (per
0,67 l d'acqua) contro la muffa delle nevi. Al massi-
mo 1 trattamento per anno e particella.

Da osservare

Autorizzato per l'utilizzazione non professionale.
Al massimo 1 trattamento per anno e particella.
Durante l'applicazione del prodotto, indossare
guanti di protezione. Alberi e arbusti al di fuori della
foresta e bosso (Buxus) questi al pieno campo: Per
proteggere gli organismi acquatici occorre garantire
che durante l'applicazione la sostanza nebulizzata
non sia immessa in acque di superficie. Il riutilizzo di
questo imballaggio è proibito.

Protezione dei minori: L'uso professionale di questo
prodotto da parte di giovani è limitato o proibito.
Ulteriori informazioni si trovano nella scheda tecnica
o di sicurezza (capitolo 15).

Primo soccorso

Togliere immediatamente tutti gli indumenti
contaminati. In caso di contatto con la pelle lavare
subito abbondantemente con acqua e sapone. In
caso di contatto con gli occhi (rimuovere le lenti a
contatto) sciacquare immediatamente con molta
acqua anche sotto le palpebre per almeno 15 minuti.
In caso di sintomi persistenti, chiamare un medico.
In caso d'ingestione consultare immediatamente il
medico. Tenere con sé il contenitore o l'etichetta del
prodotto, quando si chiama il numero d'emergenza,
un centro antiveleni o il medico.

Stoccaggio

Conservare negli imballaggi originali ben chiusi,
in luoghi asciutti e freschi, ma al riparo dal gelo.
Conservare lontano da alimenti, mangimi, bevande e
animali domestici.