



KENDO® GOLD

GEGEN RAUPEN UND SCHÄDLINGE
CONTRE LES CHENILLES ET LES RAVAGEURS
CONTRO I BRUCHI E GLI INSETTI nocivi

Kendo® Gold ist ein Insektizid-Konzentrat zum Verdünnen und Spritzen gegen Blattläuse, Käfer, Minierfliegen, Raupen, Trauermücken, Thripse, Wanzen und Weisse Fliegen an Zierpflanzen, Beeren, Gemüse, Kartoffeln und im Rasen. Die Wirkung erfolgt über Kontakt und Frass gegen beissende und saugende Insekten.

Anwendung

Spritzbehandlung Pflanzen allseitig gut mit Spritzbrühe benetzen. Beeren und Buchs mit 2 % (200 ml/10 l Wasser und 100 m²), Gemüse mit 2 ml Produkt/m² (200 ml/10 l Wasser), Blumenkulturen und Grünpflanzen 1,5 % (150 ml/10 l Wasser), Zier- und Sportrasen mit 4 % (400 ml/10 l Wasser). Bei allen Kulturen gilt wenn nicht anders angegeben als Basis: 10 l Spritzbrühe für 100 m² behandelte Kulturläche.

Wirkungsspektrum

Beeren

Erdbeere und Freiland-Himbeere: gegen Erdbeere oder Himbeerblütentstecher und Himbeere zusätzlich gegen Himbeerläufer.

Gemüse

Andenbeere, Artischocken, Aubergine, Chicorée, Kardi, Kürbisgewächse (Cucurbitaceae), Nüsslisalat, Paprika, Pepino, Salate (Asteraceae), Schwarzwurzel, Stachys, Tomaten, Topinambur, Zuckermais und alle folgend genannten Gemüse: gegen Blattläuse, Erdraupen, Minierfliegen, Thripse und Weisse Fliegen. **Asia-Salate (Brassicaceae), Cima di Rapa, Kohlarten, Meerrettich, Radies, Rettich, Rucola, Speisekohlrüben, Stielmus:** zusätzlich gegen Erdflöhe, Eulenraupen (blattfressend), Kohldrehherzgallmücke, Kohlschabe, Weisslinge. **Bohnen, Erbsen, Puffbohne:** zusätzlich gegen Erbsenblattrandläufer. **Karotten, Knollenfenchel, Pastinake, Sellerie, Wurzel-petersilie:** zusätzlich gegen Möhrenblattfloh und Möhrenfliege. **Knoblauch, Lauch, Schalotten, Zwiebeln:** zusätzlich gegen Lauchmotte. **Küchenkräuter, Mangold, Rande, Rhabarber, Spinat:** zusätzlich gegen Erdflöhe. **Spargel:** zusätzlich gegen Spargelhähnchen, Spargelläufer.

Feldkulturen

Kartoffel: gegen Kartoffelläufer.

Zierpflanzen

Blumenkulturen und Grünpflanzen: gegen Blattläufer, Blattläuse (Röhrenläuse), Blindwanzen, Erdraupen, Gallmücken, Thripse, Trauermücken, Weisse Fliegen (Mottenschildläuse). **Buchsbaum (Buxus):** gegen Buchsbaumzünsler. **Zier- und Sportrasen:** gegen Erdschnaken (Larven).

Beachten

Wartezeit: Himbeeren, Nüsslisalat, Kartoffeln 3 Wochen, Gemüse 2 Wochen (ausser Behandlung von Rhabarber und Spargel nach der Ernte).

Nur im Hausgarten. Die Wiederverwendung der Gebinde ist verboten. Gefährlich für Bienen - Darf nur ausserhalb des Bienenfluges am Abend mit

blühenden oder Honigtau aufweisenden Pflanzen in Kontakt kommen. Anwendung im geschlossenen Gewächshaus sofern keine Bestäuber zugegen sind. Zum Schutz von Gewässerorganismen muss sichergestellt werden, dass bei der Anwendung kein Sprühnebel in Oberflächengewässer gelangt. Wenn für folgende Gemüse nicht anders genannt: Maximal 2 Behandlungen pro Kultur mit diesem Produkt oder einem anderen Produkt, das diesen Wirkstoff enthält und Behandlungen im Abstand von 7–14 Tagen. Karotten, Knollenfenchel, Pastinake, Sellerie, Wurzel-petersilie: Keine Einschränkung der Anzahl Behandlungen. Behandlungen nur während dem Flug (gemäss kritischer Fangzahl) im Abstand von mindestens 7 Tagen. Knoblauch, Lauch, Schalotten, Zwiebeln: Maximal 3 Behandlungen pro Kultur mit diesem Produkt oder einem anderen Produkt, das diesen Wirkstoff enthält. Rhabarber und Spargel zusätzlich: Maximal 2 Behandlungen pro Parzelle und Jahr mit diesem Produkt oder einem anderen Produkt, das diesen Wirkstoff enthält. Behandlung von Spargel nur nach der Ernte. Kartoffeln zusätzlich: Zur Vermeidung einer Resistenzbildung darf dieses oder irgendein anderes Pflanzenschutzmittel, welches ein Pyrethroid enthält, nicht mehr als 1-mal pro Kultur ausgebracht werden. Zier- und Sportrasen: Bei Bedarf Anwendung nach 7 Tagen wiederholen.

Erste Hilfe

Beschmutzte Kleidung vor Wiedergebrauch waschen. Nach Hautkontakt sofort mit Wasser und Seife abwaschen. Nach Augenkontakt (Kontaktlinsen entfernen) sofort mit viel Wasser mehrere Minuten lang ausspülen, auch unter den Augenlidern. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt aufsuchen. Nach Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen. Verpackung oder Etikett bereithalten wenn Sie das Tox Info Suisse oder einen Arzt anrufen, oder wenn Sie einen Arzt zu einer Behandlung aufsuchen.

Lagerung

Kühl, aber frostfrei, trocken und in verschlossenen Originalgebinden aufbewahren. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten und für Haustiere unerreichbar aufbewahren.

Eine ausführliche Broschüre zur Brühemengenberechnung und Applikationstechnik für Haus&Garten finden sie mit dem QR-Code:



Kendo® Gold est un insecticide concentré à diluer et pulvériser contre les pucerons, les coléoptères, les mouches mineuses, les chenilles, les mouches du terreau (sciarides), les thrips, les punaises et les mouches blanches sur les plantes ornementales, les baies, les légumes et les pommes de terre ainsi que le gazon. Il agit par contact et ingestion sur les ravageurs broyeurs et suceurs.

Emploi

Pulvérisation, mouiller soigneusement et entièrement les plantes avec la bouillie. Baies et buis avec 2 % (200 ml/10 l d'eau et 100 m²), légumes avec 2 ml du produit/m² (200 ml/10 l d'eau), cultures florales et plantes vertes 1,5 % (150 ml/10 l d'eau), gazon d'ornement et terrains de sport 4 % (400 ml/10 l d'eau). Pour toutes les cultures, sauf indication contraire, la base est de 10 litres de bouillie par 100 m² de surface de culture traitée.

Efficacité

Baies

Fraises et framboise en plein air: contre l'anthome du fraisier ou du framboisier, les fraisiers aussi contre thrips et les framboises aussi contre ver des framboises.

Légumes

Artichaut, aubergine, cardon, chicorée witloof (chicorée-endive), coqueret du Pérou, crosnes du japon, cucurbitacées, maïs sucré, poire melon, poivron, salades (Asteraceae), scorsonère, tomate, topinambour et toutes les légumes mentionné suivante: contre mouches blanches, mouches mineuses, noctuelles terricoles ou vers gris, pucerons du feuillage, thrips. **Choux, cima di rapa, navet à tondre, radis de tous les mois, radis long, raifort, rave de Brassica rapa et B. napus, roquette, salades Asia (Brassicaceae):** aussi contre altises, cécidomyie du chou, noctuelles (défoliatrices), Pieridae, teigne des crucifères (Plutella xylostella). **Fève, haricots, pois:** aussi contre sitone de pois. **Carotte, céleri, fenouil bulbeux, panais, persil à grosse racine:** aussi contre mouche de la carotte et psylle de la carotte. **Ail, échalote, oignon, poireau:** aussi contre teigne du poireau. **Bette, betterave à salade, épinard, fines herbes:** aussi contre altises. **Asperge:** aussi contre criocière à douze points de l'asperge, criocière de l'asperge.

Cultures arabes

Pommes de terre: contre la doryphore. **Plantes ornementales**

Cultures florales et plantes vertes: cécidomyies, chrysomélidés, mirides, mouches blanches, noctuelles terricoles ou vers gris, pucerons du feuillage, mouches du terreau (sciarides), thrips. **Buis (Buxus):** contre pyrale du buis. **Gazon d'ornement et terrains de sport:** contre tipules (larves).

À observer

Délai d'attente: framboisiers, mâche, pommes de terres 3 semaines, légumes 2 semaines (sauf pour le traitement de la rhubarbe et des asperges après la récolte). Uniquement pour les jardins familiaux. La reutilisation de l'emballage est interdite. Dangereux pour les abeilles - Ne doit entrer en contact avec les plantes en fleurs ou exsudant du miellat qu'en dehors de la période du vol des abeilles, autrement dit le soir. Application uniquement dans des serres fermées, pour autant que des pollinisateurs ne soient pas présents.

Pour protéger les organismes aquatiques, il y a lieu de s'assurer que le nuage de pulvérisation ne parvient pas dans les eaux de surface lors de l'application.

Si pas autrement mentionné pour les légumes: 7 à 14 jours d'intervalle entre les traitements. 2 traitements au maximum par culture avec ce produit ou tout autre produit contenant cette substance active. Carotte, céleri, fenouil bulbeux, panais, persil à grosse racine: traitements pendant le vol uniquement (selon le seuil critique de capture) avec un intervalle de 7 jours au minimum. Ail, échalote, oignon, poireau: 3 traitements au maximum par culture avec ce produit ou tout autre produit contenant cette substance active. Rhubarbe et asperge en outre: 2 traitements par parcelle et par année au maximum avec ce produit ou tout autre produit contenant cette substance active. Traitement des asperges seulement après la récolte. Pommes de terre: Pour éviter le développement de résistances, ne pas appliquer ce produit ou tout autre contenant une pyréthrinoïde plus de 1 fois par culture. Gazon d'ornement et terrains de sport: Répéter le traitement après 7 jours si nécessaire.

Premiers soins

Laver les vêtements contaminés avant de les remettre. En cas de contact cutané, laver immédiatement et abondamment à l'eau et au savon. En cas de projection dans les yeux (enlever les lentilles de contact) rincer immédiatement et abondamment à l'eau pendant plusieurs minutes, y compris sous les paupières. En cas de persistance des symptômes, consulter un médecin. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin. Se munir de l'emballage ou de l'étiquette lorsque vousappelez le numéro d'urgence, un centre antipoison ou un médecin.

Stockage

Conserver dans un endroit frais, mais à l'abri du gel et sec dans les emballages d'origine fermés. Conserver à l'écart des aliments, boissons et animaux domestiques.

Vous trouverez une brochure détaillée sur le calcul de la quantité de bouillie et la technique d'application pour la maison et le jardin avec le code QR:



Kendo® Gold è un insetticida concentrato da diluire e spruzzare contro afidi, coleotteri, minatrici, bruchi, sciaridi, tripidi, cimici e mosche bianche su piante ornamentali, bacche, ortaggi, patate e sui tappeti erbosi. Il agisce per contatto e ingestione contro gli insetti novizi masticatori e succhiatori.

Modo d'uso

Spruzzatura, bagnare bene le piante con la poltiglia. Bacche e bosso con 2 % (200 ml/10 l di acqua e 100 m²), ortaggi con 2 ml di prodotto/m² (200 ml/10 l di acqua), colture da fiore e piante verdi con 1,5 % (150 ml/10 l di acqua), tappeti erbosi e terreni sportivi con 4 % (400 ml/10 l di acqua). Per tutte le colture, se non altrimenti specificato, la base è di 10 litri di poltiglia per 100 m² di superficie di coltura trattata.

Effetto

Bacche

Fragola, Lampone in pieno campo: contro l'antonomo delle fragole o dei lamponi, fragola inoltre contro i tripidi e sul lampone contro il verme del lampone.

Ortaggi

Alchechengio, carciofi, cardo, cicoria belga, cucurbitacee, insalate (Asteracee), mais dolce, melanzana, peperone, pepino, pomodori, scorzonera, topinambur, tuberina e tutte gli altri ortaggi menzionati: contro afidi, aleurodidi, minatrici, nozze terricole o vermi grigi, tripidi. **Cavoli/rape da taglio, cima di rapa, insalate asiatiche (Brassicacee), rafano rusticana/ramolaccio, ramolaccio, rapa di Brassica rapa e B. napus, ravanello, rucola, specie di cavoli:** anche contro altiche, cavolaie, cecidomia del cavolo, nozze (defogliatrici), tignola delle Crociere. **Fagioli, fave, piselli:** anche contro il sitone del pisello. **Carote, finocchio dolce, pastinaca, prezzemolo tuberoso, sedano:** anche contro la mosca e la psilla della carota. **Ajlio, cipolle, porro, scalogni:** anche contro la tignola del porro. **Barbabietola, bietola, erbette da cucina, rabarbaro, spinaci:** anche contro le altiche. **Asparagi:** anche contro la criocera a dodici punti e la criocera dell'asparago.

Cultura arabile

Patate: contro la dorifora della patata.

Piante ornamentali

Colture da fiore e piante verdi: contro afidi, aleurodidi, cecidomie, crisomelidi, miridi, nozze terricole o vermi grigi, sciaridi, tripidi. **Bosso (Buxus):** contro piralide del bosso. **Tappeti erbosi e terreni sportivi:** contro tipulidi (larve).

Attenzione

Periodo di attesa: lamponi, rabarbaro, patate 3xsettimane, ortaggi 2 settimane (ad eccezione del rabarbaro e degli asparagi dopo il raccolto). Soltanto in orti familiari. Il riutilizzo di questo imballaggio è proibito. Pericoloso per le api - Può entrare in contatto con piante in fiore o che presentano melata soltanto di sera, al di fuori del periodo di volo delle api. Applicazione soltanto in serre chiuse, a condizione che non siano presenti impollinatori. Per proteggere gli organismi acquatici occorre garantire che durante l'applicazione la sostanza nebulizzata non sia immessa in acque di superficie.

Se non altrimenti indicato si applica per tutte gli ortaggi: Al massimo 2 trattamenti per coltura con questo prodotto o qualsiasi altro prodotto contenente tale sostanza attiva. Trattamenti a intervalli di 7-14 giorni. Carote, finocchio dolce, pastinaca, prezzemolo tuberoso, sedano: trattamenti solo durante il volo (secondo numero critico delle

catture) a intervalli di almeno 7 giorni. Aglio, cipolle, porro, scalogni: Al massimo 3 trattamenti per coltura con questo prodotto o qualsiasi altro prodotto contenente tale sostanza attiva. Rabarbaro e asparago: Al massimo 2 trattamenti per anno e particella con questo prodotto o qualsiasi altro prodotto contenente tale sostanza attiva. Trattamento degli asparagi solo dopo la raccolta. Patate: Per evitare l'insorgere di resistenza non applicare questo o altri prodotti contenenti un piretroidi per più di 1 volta per coltura. Tappeti erbosi e terreni sportivi: Se necessario ripetere l'applicazione dopo 7 giorni.

Primo soccorso

Togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. In caso di contatto con la pelle lavare subito abbondantemente con acqua e sapone. In caso di contatto con gli occhi (rimuovere le lenti a contatto) sciacquare immediatamente con molta acqua anche sotto le palpebre per alcuni minuti. In caso di sintomi persistenti, chiamare un medico. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico. Tenere con sé il contenitore o l'etichetta del prodotto, quando si chiama il numero d'emergenza, un centro antiveneni o il medico.

Stoccaggio

Conservare negli imballaggi originali ben chiusi, in luoghi asciutti e freschi, ma al riparo dal gelo. Conservare lontano da alimenti, mangimi, bevande e animali domestici.

Trovate un opuscolo dettagliato per il calcolo della poltiglia e la tecnica di applicazione per la casa e il giardino con il seguente codice QR:

