



kühl lagern  
conserver au frais

2–5 °C

## Traunem®

### Nematoden zur biologischen Bekämpfung von Trauermückenlarven Nématodes pour la lutte biologique contre la sciaride

für/pour 6 m<sup>2</sup>

**Schützen Sie Ihre Zier- und Zimmerpflanzen, Gemüsejungpflanzen und Gewürze vor dem Wurzelfrass, den die Trauermückenlarven verursachen.**

Insektenparasitische Nematoden suchen im Boden aktiv nach Trauermückenlarven und bringen diese zum Absterben.

**Anwendung:** Die Behandlung darf nicht bei starkem Sonnenlicht durchgeführt werden, sondern eher abends oder bei bedecktem Himmel. Bei der Ausbringung muss die Bodentemperatur mindestens 10 °C betragen.

1. Giesskanne (max. 6 Liter) mit Wasser füllen. Beutelinhalt in Giesskanne schütten. Beutel sorgfältig ausspülen. Brühe immer wieder gut umrühren. Die angemachte Brühe muss innerhalb von 2 Stunden ausgebracht werden.
2. Mit der Giesskanne alle Pflanzen gleichmäßig gießen (1 Liter pro m<sup>2</sup>).
3. Während 7–10 Tagen nach der Behandlung die Erde laufend feucht halten, damit sich die Nematoden fortbewegen können.
4. Die sichtbare Wirkung tritt nach 10–14 Tagen ein. Behandlung bei Bedarf monatlich wiederholen.

**Wartefristen:** Gewürze 1 Woche

**Protégez les racines de vos plantes ornementales et d'intérieur, jeunes plants de légumes et herbes aromatiques des dégâts causé par la sciaride.**

Les nématodes entomopathogènes cherchent activement dans le sol les larves de sciaride, les attaquent et les tuent rapidement.

**Utilisation :** Le traitement ne doit pas être effectué par fort rayonnement solaire, mais plutôt le soir ou par temps couvert. Les nématodes sont épandus à l'aide d'un arrosoir. Lors de l'application, la température du sol doit être d'au moins 10 °C.

1. Remplir un arrosoir (max. 6 litres) avec de l'eau. Verser le contenu du sachet dans l'arrosoir. Rincer soigneusement le sachet. Remuer continuellement la bouillie. La bouillie doit être appliquée dans les 2 heures suivant la préparation.
2. Répartissez uniformément le contenu de l'arrosoir (1 litre / m<sup>2</sup>).
3. Pendant les 7–10 jours qui suivent le traitement, veillez à maintenir la terre humide pour faciliter la progression des nématodes.
4. L'efficacité apparaît au bout de 10–14 jours. Répéter le traitement mensuellement, si nécessaire.

**Délai d'attente :** herbes aromatiques 1 semaine

Hinweise: Von Kindern fernhalten. Nach der Arbeit Gesicht und Hände waschen. Mittel und/oder dessen Behälter nicht in Gewässer gelangen lassen.



Haltbar bei 2–5 °C bis:  
Stockable à 2–5 °C jusqu'au:

Remarques : Garder hors de portée des enfants. Se nettoyer les mains et le visage après l'utilisation. Ne pas polluer les eaux avec le produit ou son emballage.

Bewilligungsnehmer/titulaire de l'autorisation:  
Andermatt Biocontrol AG, 6146 Grossdietwil

1606

Lebende Organismen (Nematoden)/organismes vivants (nématodes), Insektizid/insecticide; XN Nematothenlarven/XN larves de nématodes; Gehalt/contenu: 3 Mio. Steinernema feltiae, Xenorhabdus bovinus; Eidg. Zulassungsnr./No. de l'homologation: W-5277